


Mariene exoten 2014




Mariene exotische macrofauna (cumulatief)



Vectoren mariene exotische macrofauna

Number of introduced species per vector



Ptilohyale littoralis (vlokkreeft)



- 2009 Rotterdam
- 2013 Wester- en Oosterschelde
- herkomst NW Atlantisch
- soms massaal

Monocorophium uenoi (vlokkreeft)



- 2013 Yerseke
- herkomst NO Pacific
- Onbekend van Europa

Ianiropsis serricaudis (zeepissebed)



- 2000
Oosterschelde
- herkomst NO
Pacific
- inmiddels ook
in Engeland en
N. Amerika
(oost en west)

Boccardia proboscidea (borstelworm)



- 2013 Ooster/
Westerschelde
- bekend van F en UK
- 2011 B, verkeerd
gedetermineerd 2001
- onder oesters

Boccardiella hamata (borstelworm)



- 2013 Ooster/
Westerschelde
- onbekend in Europa
- B: verkeerd
gedetermineerd 2001
- onder oesters

Laonome calida (borstelworm)



- 2009 Rijn/Maas/Schelde-delta
- onbekend in Europa
- oorsprong Australië
- **Capa, van Moorsel & Tempelman 2014. The Australian feather-duster worm *Laonome calida* Capa, 2007 (Annelida: Sabellidae) introduced into European inland waters? Bioinvasions Records 3(1): 1-11.**

Blackfordia virginica



- 2014 Noordzeekanaal
- Z.- Europa, NW-Atl., ZW Atl., NO Pac., NW Pac.